

# CHÊNAIES DU PIÉMONT PYRÉNÉEN À CHÊNES TAUZINS ET PÉDONCULÉS

Principaux habitats associés	Principales espèces d'intérêt communautaire	
Pelouses et landes acidiphiles (dont 4030)	Taupin violacé	Grand capricorne
Chênaies-hêtraies acidiclinales à acidiphiles	Lucane cerf-volant	Chiroptères (dont Rhinolophe euryale)
Chênaies pédonculées transitoires ou de dégradation	Pique-prune	

## Espèces principales


Chêne tauzin	Bruyère vagabonde	Chêne pédonculé	Androsème
Fragon petit houx	Asphodèle blanche	Néflier	Avoine de Thore

## Exemple d'opérations en cours

Aucun exemple recensé à ce jour.

## RÉPARTITION

L'habitat se rencontre de la façade atlantique jusqu'au nord-ouest des Hautes-Pyrénées en se raréfiant à l'est de son aire de distribution.



## DESCRIPTION

A affinité océanique et composé majoritairement de chêne tauzin, pur ou en mélange, il convient d'en distinguer deux types.

D'une part, des formations pionnières où l'évolution forestière est bloquée en raison de conditions stationnelles exigeantes : fort déficit hydrique pédoclimatique. Ces peuplements colonisent majoritairement les expositions chaudes, sur les sols pentus, superficiels et acides des piémonts pyrénéens.

D'autre part, les peuplements colonisant les terrains pastoraux et qui évoluent naturellement vers une chênaie sessiliflore puis une hêtraie-chênaie mais sont parfois bloqués par pression pastorale ou les feux.



ONF - CC

## RECOMMANDATIONS DE GESTION

Mettre en œuvre des pratiques agro-sylvo-pastorales adéquates (chargement adapté, conduite de troupeau ou clôture mobile, mise en défends de certains secteurs...).



Dans les peuplements paturés (pratiques agroforestières), veiller à la protection des recrues naturelles ou à la régénération de chênes (essentiellement tauzins) par plantation sous réserve de l'origine locale des plants.



En cas d'écobuage veiller à ce qu'ils soient raisonnés et contrôlés (réglementation régie par arrêté préfectoral).



### Peuplements avec blocage stationnel

Ne pas transformer le peuplement du fait de sa rareté en conservant les essences du cortège floristique de l'habitat, sans en introduire de nouvelles.



### Stades dynamiques vers les hêtraies-chênaies sessiliflores

Conserver des lisières et ourlets préforestiers aux conditions d'éclaircissement plus favorables au maintien du chêne tauzin.



Lors de l'entretien de ces peuplements, procéder aux éclaircies sans chercher à minimiser la part des hêtres et chênes sessiles.

0