



ONF - DF

### DESCRIPTION

La lisière constitue une limite entre deux milieux, dont l'un est généralement forestier.

C'est une zone «tampon» qu'affectionnent particulièrement de nombreux groupes faunistiques.

Structurantes au sein du paysage, ces lisières souvent riches en arbustes, servent tant de «voies de communication» que de ressource alimentaire ou de site de reproduction pour de nombreuses espèces (oiseaux, papillons, etc.).

Ainsi, à titre d'exemple, ces milieux sont utilisés par certaines chauves-souris, en particulier pour la chasse.

### Principales espèces d'intérêt communautaire

Petit rhinolophe	Laineuse du prunellier
Grand rhinolophe	Grand tétras
Rhinolophe euryale	

### Exemple d'opérations en cours

En forêt domaniale du Burat (31), préservation d'arbres isolés en lisière supra-forestière, détournement de gros arbres perchis, dépressage de zones de gaulis-perchis trop denses, notamment en faveur du Grand tétras.

### Recommandations de gestion

▶ Favoriser les lisières progressives : le passage d'un milieu ouvert à la forêt se fait sur une dizaine de mètres de largeur, en passant par des secteurs buissonnants, avec une structure verticale diversifiée. Possibilité d'éclaircir les peuplements de bordure, pour favoriser l'éclaircissement au sol et ainsi le développement des strates inférieures.

