

Exemple d'opérations en cours

En forêt domaniale de Prades (09), 1 ha de hêtraie a été placé hors sylviculture afin de préserver une zone de nidification (secteur de nidification également de la chouette de Tengmalm et du pic noir).

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Recharges d'aires		■	■									
Parades nuptiales		■	■									
Accouplements		■	■	■								
Ponte		■	■									
Couvaison		■	■	■	■							
Ecllosion			■	■								
Elevage des jeunes				■	■	■	■					
Envol des jeunes					■	■	■	■				


RÉPARTITION

L'espèce est présente sur l'ensemble de la chaîne pyrénéenne, tant en piémont qu'en altitude.

Principaux habitats (dont communautaires)

Falaises (dont 8210, 8220)

Forêts de pentes, éboulis et ravins (9180)



BIOLOGIE ET ECOLOGIE

L'habitat du faucon pèlerin s'organise autour de sites rupestres, principalement des falaises, nécessaires à sa nidification. Il survole son territoire pour chasser des oiseaux presque exclusivement en vol. L'accès à son aire est en général dégagé mais peut très bien occuper de petites falaises incluses dans les massifs forestiers, voire parfois des constructions humaines. Il y pond de 3 à 4 oeufs. Sans en dépendre, l'espèce côtoie les milieux forestiers mais fréquente moins les grands massifs boisés dépourvus de clairières.



ONF - Mika

RECOMMANDATIONS DE GESTION

Pour limiter les échecs de reproduction, éviter entre le 15 février et le 15 juin, les interventions sur les peuplements ou la desserte à proximité des sites de nidification avérée : zone de quiétude à ajuster en fonction du contexte local (topographie, peuplement...), en accord avec le propriétaire ou le gestionnaire.

+ se reporter aux recommandations de la fiche générale «Rapaces»